

Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel Et Askina® DresSil Sacrum

			5°C > 25°C	Ethylene oxide sterilised	Do not Resterilize	Single use only	Batch number	Product code	Attention, see instructions for use	Use by: year and Month	Manufacturer	Do not use if pack is damaged	Recycle
			5°C > 25°C	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Nicht erneut sterilisieren	Nur zum einmaligen Gebrauch	Chargennummer	Bestellnummer	Achtung: Gebrauchsanweisung beachten	Verwendbar bis: Jahr und Monat	Hersteller	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt	Recyclen
			5°C > 25°C	Sterilisé à l'oxyde d'éthylène	Ne pas restériliser	À usage unique	N° de lot	Référence produit	Attention, voir mode d'emploi	À utiliser: jusqu'à	Fabricant	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Recycler
			5°C > 25°C	Esterilizado por óxido de etileno	No reesterilizar	Para un solo uso	Número de lote	Número de referencia	Atención, ver las instrucciones de uso	Fecha de caducidad: año y mes	Fabricante	No utilice este producto si el envase está dañado	Reciclable
			5°C > 25°C	Gesteriliseerd met ethyleenoxide	Niet hersteriliseren	Uitsluitend voor eenmalig gebruik	Chargennummer	Artikelnummer	Let op, lees voor gebruik de bijluster	Uiterste gebruiksdatum: jaar en maand	Fabrikant	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigt	Recyclen
			5°C > 25°C	Sterilizzato con ossido di etilene	No riesterilizzare	Prodotto monouso	Numero di lotto	Codice prodotto	Attenzione: leggere le istruzioni per l'uso	Data di scadenza: mese e anno	Produttore	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Riciclabile
			5°C > 25°C	Esterilizado com óxido de etileno	Não volte a esterilizar	Uso único	Número de lote	Referencia do produto	Atenção: ver as instruções de utilização	Utilizar até: ano e mês	Fabricante	Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada	Reciclar
			5°C > 25°C	Sterilizováno ethylenoxidem	Neprovádět opětovnou sterilizaci	Pouze pro jedno použití	Číslo sárze	Kód produktu	Pozor, přečtěte si návod k použití	Spotřebovat do: rok a měsíc	Výrobce	Nepoužívejte, je-li obal poškozen	Recyklovatelné
			5°C > 25°C	Etilén-oxidálással sterilizálva	Nem sterilizálható újra	Kizárólag egyszeri használatra	Tételszám	Termékkód	Figyelem! Lásd a használati útmutatót!	Felhasználható: év, hónap	Gyártó	Ne használja, ha a csomagolás sérült!	Újrahasznosítható
			5°C > 25°C	Sterilizované pomocou ethylenoxidu	Nesterilizujte iba	na jednorazové použitie	Číslo sáre	Kód výrobku	Pozor, prečítajte si návod na použitie	Spotrebovať do: rok a mesiac	Výrobca	Ak je balenie poškodené nepoužívajte ho	Recyklovateľné
			5°C > 25°C	Sterilisert etylenoksid	Må ikke resteriliseres	Kun til engangsbruk	Batchnummer	Produktkode	NBI Se bruksanvisningen	Brukes innen: år og måned	Produsent	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet	Resirkuleres
			5°C > 25°C	Steriloitu etyleenioksidilla	Ei uudelleen sterilointia	Kertakäyttöinen	Eränumero	Produktкод	VARNING, se bruksanvisningen	Används endast: år och månad	Tillverkare	För ej användas om förpackningen är skadad	Återvinningsbara
			5°C > 25°C	Αποστεριωμένο με αιθυλενοξείδιο	Μην επαναστεριώνετε	Μην επαναχρησιμοποιείτε	Αριθμός παρτίδας	Κωδικός προϊόντος	Προσοχή, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης	Χρησιμοποιήστε έως: έτος και μήνας	Κατασκευαστής	Μην το χρησιμοποιείτε εάν ο συσκευασίας έχει υποστεί ζημιά	Ανοκυκλώσιμο
			5°C > 25°C	Sterilizat cu oxid de etilēnă	Nu se reesterilizează	Exclusiv de unică folosință	Număr lot	Cod produs	Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare	A se utiliza înainte de anul și luna	Producător	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	Reciclabil
			5°C > 25°C	Стерилизовано с применением этиленоксида	Не стерилизовать повторно	Только для однократного применения	Номер серии	Арт.-№	Внимание, смотрите инструкции по применению	Годен до: Изготовитель	Не использовать если упаковка нарушена	Вторичная переработка	Reciclar
			5°C > 25°C	Стерилизирано с етиленов оксид	Не пререстерилизирате	Само за еднократна употреба	Партида №	Код на продукта	Внимание, вкитте указания за употреба	Исполняете до: година и месец	Производител	Не употребявайте, ако опаковката е повредена	Reciclar
			5°C > 25°C	Etylen oxid steriliseret	Må ikke resteriliseres	Kun til engangs brug	Batch nr.	Varenr. NB	Se brugsvejledningen	Anvendes inden: år og måned	Producent	Anvendes ikke, hvis emballagen er beskadiget	Genventilgning
			5°C > 25°C	Steriliseeritud etüleenoksiidiga	Mitte resteriliseerida	Ainult ühekordselt kasutamiseks	Parti nr.	Toetokode	Tähelepanu, lugege kasutusjuhendit	Kõiklikk kuni: aasta/kuu	Tootja	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud	Ümberõeldav
			5°C > 25°C	Sterilizãts ar etilēna oksĩdu	Nesterilizãts atkārtoti	Vienreizējã lietošanai	Sãrijas numurs	Produkta kods	Uzmanĩt! Skatĩ lietošanas instrukcijãt	Derĩgs lidz: Ražotãjs		Nelietot, ja iepakojums ir bojãts	Pãrstãdãjãms
			5°C > 25°C	Sterilizavota etileno oksid	Nesterilizuoti atkartinai	Vienkartinio naudojimo	Partijos numeris	Produkto kodas	U dėmas, žr. naudojimo instrukcijas	Tinka vartoti iki: metai ir mėnuo	Gamintojas	Nenaudoti, jei pažeista pakuotė	Perdiramas
			5°C > 25°C	Sterilizovãno tienkĩm etylenũ	Ne resterilizovãt	Do jednorãzovõ užitũ	Nr seriĩ	Numer katalogovõ	Uvããe, pred zastõvãnĩem pozõvãt sã instrukciã užitũ	Uvããe pred: rokĩ miesãĩ	Producent	Nie uvããvãt gõj opakovãnie jest uszkodzone	Podlega przetworzeniu
			5°C > 25°C	Sterilizirãno s etilēnoksĩdu	Nesterilizirãno ponovno	Zã enkratno uporã	Seriã	Katalogskã številka proizvoda	Nãtãnão zberite navodilo za uporã	Uporãbno do: leto in mesec	Izdelovalec	Ne uporabljãte, je-li pakiranje poškodovano	Reciklirãte
			5°C > 25°C	Etilen oksit ile sterilize edilmiřtir	Yeniden sterilize etmeyiniz	Tek kullanĩmlĩkr	Lot numarası	Ürũn kodu	Lütfen kullanma kilavuzunu okuyunuz.	Son kullanma tarihĩ	Üretici firma	Ambalaj hasarlanysa kullanĩmlĩmaldr	Gerĩ Dõnũřũm
			5°C > 25°C	EIOG滅菌済み	再滅菌しないでください。	単回使用	ロット番号	製品コード	注意、添付文書を参照してください	使用期限: 年月 製造元		開封されている場合は使用しないでください	リサイクルが可能かどうか

INSTRUCTIONS FOR USE / GEBRAUCHSANWEISUNG / MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES DE USO / GEBRUIKSAANWIJZING / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / NÁVOD K POUŽITÍ / HASZNÁLATI UTASÍTÁS / NÁVOD NA POUŽITIE

EN <p>PRODUCT DESCRIPTION Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel and Askina® DresSil Sacrum are sterile dressings consisting of a perforated silicone wound contact layer • a highly absorbent polyurethane foam • a vapour permeable waterproof film • a soft adhesive film In the presence of exudate, Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel and Askina® DresSil Sacrum help maintain a moist wound environment conducive to natural healing process. INDICATIONS Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel and Askina® DresSil Sacrum are indicated for the management of moderately exuding, partial to full thickness wounds, such as: pressure ulcers; Venetranungen ersten und zweiten Grades; diabetisch Fuß ulcers; first and second degree burns; donor sites; skin tears; and difficult to dress areas. CONTRAINDICATIONS Do not use Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel or Askina® DresSil Sacrum if: • on ulcers resulting from infection, such as tuberculosis, syphilis, or other infectious diseases • if signs of infection develop or if the wound deteriorates unexpectedly, contact the proper medical authority. Resume use when normal healing conditions are present. INSTRUCTION FOR USE 1) Cleanse the wound with an appropriate solution (eg. Protosan®). 2) Dry the surrounding skin. 3) Select the appropriate size to cover the wound surface, ensure a 2 to 3 cm margin of skin around the edge. 4) Remove one of the backing liners and apply the adherent side to the wound. 5) Smooth the dressing over the wound, removing the remaining backing liner to the position Askina® DresSil Heel, follow Fig. 1. For venous leg ulcers, compression therapy may be used in conjunction with Askina® DresSil Heel and Askina® DresSil Border when so directed by a physician. For difficult to dress areas additionally secure with tapes or bandages. DRESSING REMOVAL/CHANGES The interval between dressing changes will depend entirely upon the state of the wound and the amount of exudate. SPECIAL NOTES The wound may initially appear to increase in size in the early stages of treatment. This is normal and occurs because debris is removed from the edges of the wound. This clears the way for healing. There are cases where healing is impaired as a result of underlying infection. In these cases, Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel or Askina® DresSil Sacrum alone may make little or no progress, and additional debridement under sterile conditions will be necessary as well. If after 4-6 weeks of Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel or Askina® DresSil Sacrum treatment, there has been no improvement, then, in line with accepted wound management practice, the original diagnosis and overall therapy should be reassessed. CE is a Russian Safety Standards (GOST-R) mark. PRESERVACTIONS Askina® DresSil is available in the following sizes: • 5 x 7 cm • 10 x 10 cm • 15 x 15 cm • 10 x 20 cm Askina® DresSil Border is available in the following sizes: • 6 x 6 cm • 7.5 x 7.5 cm • 10 x 10 cm • 15 x 15 cm • 15 x 20 cm • 20 x 20 cm Warning: Re-use of single-use devices creates a potential risk to the patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability. Contamination and/or limited functionality of the device may lead to injury, illness or death of the patient. Sterile unless pack damaged or opened</p>	DE <p>PRODUKT-BESCHREIBUNG Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel und Askina® DresSil Sacrum ist eine sterile Wundauflage, die sich wie folgt zusammensetzt: • perforiertes Silikon-Indikatortuschicht, • besonders saugfähiges Polyurethan-Schaummaterial, • dampfdurchlässiger, wasserdichter Film auf der Außenseite. Bei exsudierenden Wunden unterstützt Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel und Askina® DresSil Sacrum die Erhaltung eines feuchten Wundmilieus, das den natürlichen Heilungsprozess fördert. INDIKATIONEN Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel und Askina® DresSil Sacrum sind für die Behandlung von mäßig exsudierenden, oberflächlich bis tiefen Wunden, wie z. B.: Dekubitalgeschwüren; Ulcera cruris, venös oder arteriell; diabetischem Fuß; Venenstörungen ersten und zweiten Grades; Organspendenentnahmestellen; Hautrisen; Stellen, an denen Wund-aufgaben nur schwer zu befeuchten sind. GEGENANZEIGEN Nicht verwenden, wenn: • Geschwüren, die durch chronische Infektionen (Tuberculose, Syphilis) oder tiefe Pilzinfektionen verursacht wurden. • Verletzungen 3. Grades. • Falls Anzeichen einer Infektion auftreten (Fieber, Ödem, Rötung) oder sich der Zustand der Wunde unerwartet verschlechtert, sollte die Behandlung unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Askina® DresSil Produkte erst wieder anwenden, wenn der Wundheilungsprozess normal verläuft. Wenden Sie Askina® DresSil nicht zusammen mit oxidierenden Stoffen, wie Hydrochloridlösungen, an. Reparieren Sie das treatment des Wundmilieus. ANWENDUNGSHINWEISE 1) Reinigen Sie die Wunde mit einer geeigneten Lösung (z. B. Protosan®) in Übereinstimmung mit den üblichen Verfahren. 2) Trocknen Sie die umliegende Haut. 3) Wählen Sie die richtige Größe für das Wundauflage aus, welche die komplette Oberfläche der Wunde bedeckt. Vergewissern Sie sich, dass 2 bis 3 cm des Schaummaterials über den Wundrand hinausreichen. 4) Entfernen Sie einen der Schutzfolien und die haftende Seite auf die Wunde auflegen. 5) Wundverband auf die Wunde aufbringen, dabei die verbleibende rückwärtige Schutzfolie entfernen. 6) Um Askina® DresSil Heel und Askina® DresSil Border anzuwenden, folgen Sie der Anweisung der Abbildung Fig. 1. Im Fall von venösen Beinulcera kann an Anraten eines Arztes eine Kompressionstherapie in Verbindung mit der Askina® DresSil Heel und Askina® DresSil Border durchgeführt werden. An Stellen, an denen Wundauflagen nur schwer zu befeuchten sind, kann Askina® DresSil und Askina® DresSil Sacrum, zusätzlich mit Tape oder Bandagen gesichert werden. ENTERNENWECHSEL DER WUNDAUFLAGE Die Abstände zwischen den Wundauflagen sollten vollständig von dem Zustand der Wunde und der Menge des Exsudats abh. und Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Heel oder Askina® DresSil Sacrum sollte gewechselt werden, wenn dies notwendig ist. Exsudat gestigtes, durchschnittlich jedoch alle 2 bis 3 Tage oder alle 24 Stunden bei stark exsudierenden Wunden. Unlichte Wundauflagen sollten umgehend gewechselt werden. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung mit Askina® DresSil Border oder Askina® DresSil Sacrum kann es zu einer Entzündung kommen, die sich die Wunde vergrößert. Dies ist normal und liegt daran, dass nekrotisches Gewebe von den Wundrändern entfernt wird, wodurch der Heilungsprozess erleichtert wird. In diesen Fällen ist es ratsam, die Wunde mit einem Antiseptikum zu reinigen, falls nötig eine Spüllösung verwenden. BESONDERE HINWEISE Zu Beginn der Behandlung</p>
---	---

